

提高警覺 預防猩紅熱感染

各位家長：

本園於 4 月 30 日接獲衛生防護中心通知，有學生感染猩紅熱，猩紅熱是由甲類鏈球菌引致的細菌感染，主要影響 10 歲以下的兒童。鏈球菌可存活於患者的口腔、咽喉和鼻子，可透過飛沫或直接與受感染的呼吸道分泌物接觸而傳播。本園即時指導工友加強清潔流程，並打開所有窗戶，確保空氣流通，為保障幼兒身體健康，請家長留意子女身體健康狀況，如發現幼兒出現發燒、喉嚨痛和身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹，請立即就診。同時，為免病菌蔓延，請家長讓患病之幼兒留在家中休息，直至康復後才回校上課。

(一) 認識猩紅熱

病徵

- 病發初期通常出現發燒和喉嚨痛，偶爾會有頭痛、嘔吐和腹痛。
- 患者的舌頭或會出現草莓般（呈紅色和凹凸）的外觀。
- 在發病首天或翌日，身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹。其後紅疹會蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部和腹股溝。
- 紅疹多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。

潛伏期

- 1 - 3 天

治理及預防方法

- 諮詢醫生有助了解病情；並遵從醫生的建議使用藥物，以紓緩病徵。
- 如出現發燒，喉嚨痛應多喝開水和多休息。
- 患上猩紅熱的兒童不應上學，應留在家中休息（通常在紅疹出現約 1 星期後），以免把病毒傳染給校內其他同學
- 家長須留心觀察兒童的病情。如出現持續發燒、拒絕進食、嘔吐或嗜睡等病徵，應及早求診
- 兒童如患上猩紅熱應避免到公眾場所
- 家長亦要小心觀察家中其他兒童，是否出現猩紅熱的病徵

(二) 本園亦已在園內進行衛生措施：

- 以 1 比 49 濃度的漂白水清潔及消毒物件及玩具。
- 為確保空氣流通，學校會將窗戶打開。
- 將有病徵的學生與其他學生分隔，並儘快通知家長，把學童接回家中休息。
- 每天早上返學及放學時段，學校將不會開放予家長進入。

如對以上措施有任何查詢，請致電 23276311 與學校聯絡。

九龍城浸信會慈愛幼稚園啟

主曆二零一八年五月二日

✂-----

回 條

貴校於 2018 年 5 月 2 日發出之通告有關「提高警覺 預防猩紅熱」，本人已知悉，並會按指引採取相應的做法。

此覆

九龍城浸信會慈愛幼稚園

學生姓名：_____

班 級：_____

家長簽署：_____

月 日